

රසායනික චිකිත්සාවෙහි අතුරු ආබාධ

අතුරු ආබාධ ඇති කරන්නේ කෙසේද?

පිළිකා සෛල වැනි ඉක්මණින් වර්ධනයවන සෛලවලට රසායනික චිකිත්සාව මගින් බලපෑම් ඇතිකරයි. නමුත් ශරීරයෙහි ඇති වෙනත් සෛලද වේගයෙන් වර්ධනයවේ. මේවා ඇත්තේ ඇට මිදුළු (රුධිර සෛල වර්ධනය වන ස්ථානයේ), ආහාර මාර්ග පද්ධතිය (කට, ආමාසය සහ බඩවැළ), හිසකෙස් සහ ප්‍රජනන පද්ධතිය තුළය. අතුරු ආබාධ ඇතිවන්නේ රසායනික චිකිත්සා ප්‍රතිකාර මගින් මෙම සෞඛ්‍යයසම්පන්න සෛල හානිවුවිටය. සාමාන්‍ය වශයෙන් රසායනික චිකිත්සා මගින් ඇතිවන අතුරු ආබාධ සිදුවන්නේ දෙනු ලබන රසායනික චිකිත්සා ප්‍රමාණය සහ මාත්‍රාව අනුවය. ප්‍රතිකාරවලින් ඇතිවන බොහෝ අතුරු ආබාධ නාවකාලිකවේ.

පිළිකා ප්‍රතිකාර මගින් ඇතිවන ප්‍රධානම අතුරු ආබාධ මොනවාද?

රසායනික චිකිත්සාව මගින් ඇට මිදුළු තුළ නිපදවන රුධිර සෛලවලට හානි පැමිණිය හැකිය. මේ මගින් රතු රුධිරාණු අඩුවීම (ඔක්සිජන් රැගෙන යන), රුධිර පට්ටිකා අඩුවීම (ලේ ගැලීම නවත්වන) සහ සුදු රුධිරාණු අඩුවීම (ආසාදනවලට ඵලදායී සටන් කරන) ඇතිවිය හැකිය. ඔබගේ වෛද්‍යවරයා විසින් ඔබගේ දරුවාට නිතිපතා රුධිර පරීක්ෂා නියම කරන අතර වරින් වර රුධිරය ලබාදීම නියම කළ හැකිය. ඔබගේ දරුවා අසනීප වුවහොත් හෝ උෂ්ණත්වය 38.5 සේ රට වැඩිවුවහොත් **ගැබ් වශය** රෝහල සමඟ සම්බන්ධවීම වැදගත්වේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා 'රුධිර පරීක්ෂා සහ රුධිර ගණන් ගැනීම' විස්තර පත්‍රිකාව බලන්න.

ප්‍රතිකාර මගින් ආහාර මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාස සහ වේදනා ඇතිකරමින් සෛලවලට හානි ගෙනදිය හැකිය. සමහර විට වේදනාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බොහෝ අවශ්‍යවිය හැකිය. හොඳ මුඛ සෞඛ්‍යය මගින් කටෙහි ව්‍යා මගින් ඇතිවන ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානම අඩුකරගත හැකිවේ.

සමහර බොහෝ මගින් පාචනය ඇතිවිය හැකි අතර සමහරක් බොහෝ මගින් බඩ විරෝධය සිදුවිය හැකිවේ.

ඔබගේ දරුවාගේ වැසිකිලි ගාම සම්බන්ධ කිසියම් වෙනසක් ඇතොත් ඔබගේ හේදිය හෝ වෛද්‍යවරයා සමඟ කථා කරන්න.

රසායනික චිකිත්සා හේතුවෙන් ඔක්කාරය සහ වමනය ඇතිවිය හැකිය. ඔක්කාරය සහ වමනයට ප්‍රතිකාර කිරීමට බොහෝ ලබාදේ. මෙම බොහෝ ඔබගේ නිවසේදී පාවිච්චියටද තබාගනු ඇත.

පසුපිට හා සම්බන්ධවේ

ප්‍රතිකාර හේතුවෙන් සියළුම ළමුන්ගේ වාගේ හිසකෙස් හැලේ. නැතිවයන හිසකෙස් ප්‍රමාණය ප්‍රතිකාරයේ ආකාරය අනුව වෙනස්වේ. හිසකෙස් හැලීම සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භවන්නේ රසායනික චිකිත්සාවෙන් සති දෙකේ සිට තුන අතර කාලයකදීය. සියළු කෙස් එක් රැයකින් නැතිවීයා හැකි අතර සමහර විට එ සඳහා සති කිහිපයක් ගතවිය හැකිය. හිසකෙස් යාම බොහෝදුරට හිසකෙස් හැලීම සිට තට්ටය ඇතිවීම දක්වා විය හැකිය. කෙස් හැලීම ශරීරයේ, ඇති පිහාටු සහ ඇති බැම් ඇදී ස්ථානවලද විය හැකිය. හිසකෙස් සැමවිටම නැවත වැටෙන අතර පෙනීම වෙනස් විය හැකිය.

මට වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැක්කේ කොහිත්ද?

ඔබගේ දරුවාට ලබාදෙන ප්‍රතිකාරවල විශේෂ අතුරු ආබාධ ඔබගේ වෛද්‍යවරයා සහ හෙදිය විසින් ඔබට පැහැදිලි කර දෙනු ඇත. ඔබගේ මුල් භාෂාව ඉංග්‍රීසි නොවේනම්, මෙම හමුවීමවලදී උපකාර ලබා ගැනීමට භාෂා පරිවර්තකයෙකු ලබා ගන්න. විශේෂිත බෙහෙත් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔබගේ oncology ඖෂධවේදියා හොඳ පුද්ගලයෙකි. මෝඩ ප්‍රශ්නයක් යනුවෙන් කිසිවක් නොමැතිබව හොඳින් මතක තබා ගන්න.

වගකීමෙන් බැහැරවීම: අධ්‍යාපනය සහ තොරතුරු සඳහා පමණි. ප්‍රකාශනය පලකරන අවස්ථාවේ මෙහි අඩංගුදේ නිවැරදිවේ. කෙස්වුවද, කාලයක් පුරා තොරතුරු වෙනස්විය හැකිය. ඔබගේ වෛද්‍ය ප්‍රශ්න සඳහා සැමවිටම ඔබගේ සෞඛ්‍යය රැකවරණ කණ්ඩායමෙන් උපදෙස් ලබාගන්න.

